

CUERPO CENTRAL

INSECTICIDA - ACARICIDA
GRUPO 13

CLORFENAPIR 24% AGROTERRUM

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Composición:

clorfenapir: 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrol-3-carbonitrilo.....	24 g
Coadyuvantes y solvente c.s.p.....	100 cm ³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA con el N°: 40.956

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

Origen: China

NO INFLAMABLE

AGROTERRUM S.A.

Bouchard 468 4° G – C.A.B.A.

Tel. 3492-290394 – www.agroterrum.com.ar

NOTA: No estando ni el almacenamiento ni su aplicación bajo el control de nuestra firma, no nos responsabilizamos ante daños de ningún tipo por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.



NOCIVO

Banda toxicológica de color Amarillo Pantone C

CUERPO IZQUIERDO

PRECAUCIONES:

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Evítese el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Durante la preparación y aplicación use guantes y botas de goma, máscara con respirador apropiado para pesticidas y ropa protectora adecuada (pantalón largo y chaqueta de mangas largas). No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lávese cuidadosamente con jabón y agua después de la aplicación. No utilice equipos con pérdidas. No destape picos, orificios, válvulas, cañerías, etc. con la boca.

RIESGOS AMBIENTALES:

AVES: Muy tóxico. De acuerdo a la evaluación realizada este producto presenta un riesgo tolerable para las aves, en relación al uso y dosis autorizados por el SENASA e indicados en este marbete.

ORGANISMOS ACUATICOS: Muy tóxico. No aplicar **CLORFENAPIR 24% AGROTERRUM** en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. Deriva o escurrimiento desde áreas tratadas con **CLORFENAPIR 24% AGROTERRUM** hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación puede resultar peligroso para organismos acuáticos. No se halla autorizada la aplicación aérea de este producto.

ABEJAS: Moderadamente tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Vacíe completamente el envase en el equipo de aplicación y efectúe un triple lavado del mismo. El agua proveniente de esta limpieza se agregará al tanque de la pulverizadora para ser utilizado en la tarea prevista.

Luego de realizar el triple lavado de los envases, elimínelos de acuerdo a lo indicado en el cuadro "Eliminación de envases vacíos". Los remanentes del caldo y del lavado de envases y equipo aplicador, puede aplicarse sobre zonas no cultivadas y alejados de centros poblados y de tránsito frecuente de personas y animales domésticos.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:

Efectuar un triple lavado antes de proceder a la destrucción de los envases. Los envases deben ser inutilizados por perforación y posteriormente eliminados mediante empresas habilitadas para tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seco, fresco y bajo llave, alejado de alimentos.

DERRAMES:

Recoja el líquido derramado con un material absorbente como arena, aserrín, tierra o elementos específicos para contención de derrames y recolecte el material en containers cerrados e identificados para su posterior incinerado. Luego enjuague el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión: Tomar dos vasos de agua y provocar el vómito mediante la introducción de los dedos en la garganta. No provocar el vómito o suministrar nada por boca a personas inconscientes.

En caso de contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lávese la parte afectada con abundante agua limpia y jabón. Acudir al médico.

En caso de inhalación: Retire la persona afectada del área contaminada.

Si es necesario, aplique respiración artificial.

En caso de contacto con los ojos: Enjuáguelos bien con agua corriente por lo menos durante 15 minutos. Si persiste la irritación, acudir al médico.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:

Clase toxicológica (OMS 2009): II - Moderadamente Peligroso. En caso de accidentes aplicar tratamiento sintomático. No hay antídoto específico.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se han encontrado descripciones de intoxicaciones en el uso laboral de este producto. No es irritante dermal y es levemente irritante ocular.

ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:

Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez. / Tel.: (011) 4962-6668 /4962-2247. Conmutador: 4962-9280/9212 / Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas. / Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777. Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03) / Centro Toxicológico del Hospital de Clinicas José de San Martín. / Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806 TAS-Rosario, Prov de Santa Fe. EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR A TAS (0341) 424-2727

CUERPO DERECHO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: CLORFENAPIR 24% AGROTERRUM es un Insecticida que actúa por ingestión y contacto. Como una práctica general de manejo de resistencia, este producto debe ser aplicado secuencialmente a otros productos registrados que tengan modos de acción diferentes. **CLORFENAPIR 24% AGROTERRUM** se recomienda en el cultivo de Soja para control de *Anticarsia gemmatilis*, *Rachiplusia nu* y *Chrysodeixis includens*. En el cultivo de Tomate para el control de Polilla del tomate *Tuta absoluta* y en el cultivo de Algodón para el control de Oruga de la hoja *Alabama argillacea*.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación: Llenar parcialmente con agua el tanque de la mochila de aplicación o la pulverizadora (manteniendo el sistema de agitación en funcionamiento), agregar la cantidad recomendada de **CLORFENAPIR 24% AGROTERRUM** y completar el volumen de agua.

No deje el caldo preparado de un día para otro. SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

Para el cultivo de **Tomate**, **CLORFENAPIR 24% AGROTERRUM** debe ser aplicado con mochilas de presión manual o motopulverizadoras con mangueras y lanzas de alta presión (entre 80 y 200 lb/pulg²) y el mojado debe ser hasta punto de goteo cubriendo totalmente la planta. El volumen de agua necesario estará en función del tamaño del cultivo pudiendo variar de 500 a 2000 litros por hectárea.

Para el cultivo de **Algodón**, **CLORFENAPIR 24% AGROTERRUM** se aplicará con pulverizadoras terrestres, asperjando como mínimo 100 litros por hectárea. Utilizar pastillas de cono hueco y presión entre 40-60 lb/pulg². Realizar una adecuada cobertura del cultivo según el estado de desarrollo del mismo y según la ubicación de la plaga. **CLORFENAPIR 24% AGROTERRUM** actúa sobre todos los estadíos larvales de *Alabama argillacea* pero se obtiene una eficacia máxima cuando las aplicaciones se dirigen a los primeros estadíos larvales de la misma. **CLORFENAPIR 24% AGROTERRUM** controla por igual a los biotipos no resistentes como resistentes a compuestos piretroides.

Para el cultivo de **Soja**, se aplicará con pulverizadoras terrestres, asperjando como mínimo 100 litros por hectárea, con el fin de lograr una buena cobertura (50-70 impactos/cm²). Utilizar presión entre 40-60 lb/pulg². Realizar una adecuada cobertura del cultivo según el estado de desarrollo del mismo y según la ubicación de la plaga. **CLORFENAPIR 24% AGROTERRUM** actúa sobre todos los estadíos larvales de *Anticarsia gemmatilis*, *Rachiplusia nu* y *Chrysodeixis includens*, pero se obtiene una eficacia máxima cuando las aplicaciones se dirigen a los primeros estadíos larvales de las mismas.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	TRATAMIENTO
TOMATE	Polilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>)	50 cm ³ de CLORFENAPIR 24% AGROTERRUM/100 L de agua (*)	Ante aparición de la plaga.
ALGODÓN	Oruga de la hoja (<i>Alabama argillacea</i>)	830 cm ³ /ha (*)	Aplicar cuando se observan 15-20 larvas por metro de surco, preferentemente hasta L3 (larvas de 1,5-2 cm).

SOJA	Oruga de las leguminosas (<i>Anticarsia gemmatalis</i>) Oruga medidora (<i>Rachiplusia nu</i>) Falsa oruga medidora (<i>Chrysodeixis includens</i>)	800 cm ³ /ha (*)	Aplicar cuando se observen 10-15 larvas por metro de surco. Larvas con tamaño < 1,5 cm (L2-L3). No realizar más de dos aplicaciones por ciclo de cultivo.
-------------	--	-----------------------------	---

* Debe agregarse aceite emulsionable en la proporción de 0,3 % de volumen de aceite en volumen de caldo.

RESTRICCIONES DE USO:

Período de carencia: Entre la última aplicación y cosecha deben transcurrir: Tomate: 7 días (No superar las 5 aplicaciones en todo el ciclo del cultivo), Soja: 40 días, Algodón: exento.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso al área tratada: No ingresar al área tratada sin vestimenta de protección adecuada hasta que la pulverización haya secado completamente, dejando transcurrir como mínimo 24 horas desde el momento de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: CLORFENAPIR 24% AGROTERRUM es compatible con la mayoría de los plaguicidas aplicados. En caso de duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD: Aplicado en el momento y a las dosis recomendadas, **CLORFENAPIR 24% AGROTERRUM** no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO