

PRECAUCIONES:

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manejo del producto. Evitar el contacto con el pulverizador. No destapar picos ni boquillas con la boca. **Para su seguridad después del tratamiento:** Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES:

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. **Toxicidad para peces:** Prácticamente no tóxico. **Toxicidad para abejas:** Virtualmente no tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede aplicar este nuevo preparado sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, alejadas de centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:

HERBICIDA DESECANTE

Grupo 14

SAFLUFENACIL 70 WG

AgrOTERRUM


GRÁNULOS DISPERSABLES

COMPOSICIÓN

Saflufenacil: N'-[2-cloro-4-fluoro-5-[1,2,3,6-tetrahidro-3-m-til-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)pirimidin-1-yl]benzoyl]-N-isopropil-N-metilsulfamida.....70 g coadyuvantes e inerte ..c.s.p.....100 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscrito en SENASA con el N° 42.327

AGROTERRUM S.A.
Bouchard 468 4° G - C.A.B.A.
Tel. (011) 2903394 - www.agroterrum.com.ar



Lote N°:

Fecha de Vencimiento:

ESCANEA Y CONOCE TODA LA LÍNEA DE PRODUCTOS

NO INFLAMABLE

AGROTERRUM BETTER AGRICULTURE

marketing@agroterrum.com.ar @agroterrum www.agroterrum.com.ar Agroterrum

NOTA: No estando ni el almacenamiento ni su aplicación bajo el control de nuestra firma, no nos responsabilizamos ante daños de ningún tipo por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.

Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Inutilizar las bolsas perforándolas y evitando dañar la etiqueta. Las bolsas perforadas deben colocarse en contenedores para ser enviadas a una planta especializada para su disposición final. En caso de tratarse de bidones y botellas respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su tratamiento. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos. Las cajas de cartón del embalaje se pueden depositar junto a residuos comunes, siempre que no hayan sufrido derrames de producto. Queda prohibida para la realización del Triple Lavado toda carga de agua que implique contacto directo con fuentes y reservorios de agua, mediante inmersión del envase vacío.

En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.

En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:
PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III). IRRITACIÓN DERMAL: LEVE IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA IV. IRRITACIÓN OCULAR: MODERADO IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA III: Causa irritación moderada a los ojos. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

ALMACENAMIENTO:
Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente identificado y lejos de alimentos humanos y forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Guardar en un lugar cerrado con llave. Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Evitar temperaturas bajo 0 °C y sobre 35 °C.

DERRAMES:
En caso de que el producto sea derramado, barrer los gránulos y disponer en tambores para su destrucción en sitios autorizados. No usar agua. Cubrir los derrames del caldo de aplicación con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
C.A.B.A.: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247. Comnutador: 4962-9280 / 9212. **Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín.** Tel: (011) 5950-8804 y 5950-8806. **BUENOS AIRES:** Haedo, **Centro Nacional de Intoxicaciones Polidifú-co Prof. A. Posadas.** Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777. Comnutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03). **CORDOBA:** Hospital de Niños. Corrientes 643 Tel: (0351) 421-5303. **ROSARIO:** Hospital de Niños de Rosario Tel: (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612. **T.A.S. CASAFE:** (0341) 448-0077 ó 424-2727. **MENDOZA:** Hospital Central. Tel: (0261) 423-4913.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado.

En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Beber y enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona

expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada.

En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.

En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:
PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III). IRRITACIÓN DERMAL: LEVE IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA IV. IRRITACIÓN OCULAR: MODERADO IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA III: Causa irritación moderada a los ojos. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Mareos, irritación de los ojos, irritación del tracto respiratorio.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
C.A.B.A.: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247. Comnutador: 4962-9280 / 9212. **Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín.** Tel: (011) 5950-8804 y 5950-8806. **BUENOS AIRES:** Haedo, **Centro Nacional de Intoxicaciones Polidifú-co Prof. A. Posadas.** Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777. Comnutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03). **CORDOBA:** Hospital de Niños. Corrientes 643 Tel: (0351) 421-5303. **ROSARIO:** Hospital de Niños de Rosario Tel: (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612. **T.A.S. CASAFE:** (0341) 448-0077 ó 424-2727. **MENDOZA:** Hospital Central. Tel: (0261) 423-4913.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No existen antecedentes de sinergismo, aditividad o potenciación.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:
SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM es un herbicida que actúa por contacto, de efecto desecante y aplicación postemergente de las malezas. Es un inhibidor de la protoporfirinógeno-IX-oxidas (PPO).

Aplicación terrestre en cultivos extensivos: SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM + Glifosato debe aplicarse con pulverizadores equipados con un botalón con picos provistos de pastillas de abanico plano 80-02, 80-03, 110-02, 110-03. Se debe lograr como mínimo 60 impactos homogéneos /cm2 (de 200 micrones). La presión de aspersión debe ser de 2,1 a 3,2 kg/ cm2 (30-45 libras/pulg2). El volumen de aplicación debe ser de 100 a 150 litros de agua/ha. Asperjar sólo cuando las condiciones de humedad favorezcan el activo crecimiento de las malezas y el viento no cause deriva excesiva. Evitar que la deriva caiga sobre otros cultivos adyacentes. Evitar la superposición durante la aplicación. No se debe utilizar pastillas anti-deriva o cono hueco.

Aplicación en frutales: Aplicar con equipos pulverizadores equipados con botalón fijo en el "interfilario" o "calle" del monte frutal y botalones móviles o manualmente en la "banda de plantación" o "línea de plantación". Las pastillas para la aspersión deben ser de abanico plano: 8002/8003 o 11002/11003. La presión de aspersión debe ser de 2,1 a 3,2 kg/cm2 (30-45 libras/pulg2). El volumen de aplicación debe ser de 100 a 200 litros de agua/ha. La aplicación debe ser dirigida a las malezas. Debe evitarse el contacto de **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** + Glifosato con ramas, hojas y frutos del árbol frutal. Es aconsejable el uso de protectores y/o picos anti-deriva.

Aplicación aérea con drones: Evitar formación de gotas extremadamente finas, se sugiere el empleo de boquillas que permitan aplicar con tamaños de gota segura, mayor a 200 micrones. Es recomendable realizar pruebas de compatibilidad a escala considerando el volumen de agua a aplicar, no menor a 10 L/ha, especialmente en caso de aplicar en mezcla de tanque. Ajustar altura de vuelo y ancho de faja de acuerdo con las características del equipo y al objetivo al que se quiera aplicar, de manera de asegurar una buena calidad de aplicación. Se recomienda realizar la aplicación en un rango de altura comprendido entre 1,5 y 3 metros sobre el canopy; y una velocidad de avance comprendida entre los 10 y 15 km/h.

Importante: Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. Usar **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. **Utilizar siempre agua limpia.**

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN	OBSERVACIONES
SOJA MAÍZ SORGO TRIGO CEBADA	35 g/ha + Glifosato 1080 g i.a. como eq.ac./ha (*),(**)	Barbecho químico o tratamiento de quemado previo a la siembra del cultivo.	Se recomienda que en el momento de aplicación las malezas no excedan los 20 cm de altura o 10 cm de diámetro y que estén en activo crecimiento, sin sufrir estrés. Es un tratamiento que puede complementarse con otros productos registrados para el cultivo, dependiendo la problemática de malezas existente.
	70 g/ha + 250 ml/ha Ésteres metílicos en mezcla con siliconados	Pre-cosecha de Soja	Aplicar cuando se tenga el 90% de las vainas maduras, de un color marrón.
	35 g/ha + Glifosato 1080 g i.a. como eq.ac./ha (*),(**)	Con altura de la maleza de 20 cm o 10 cm de diámetro	Se recomienda que en el momento de aplicación, la maleza no exceda los 20 cm de altura o 10 cm de diámetro. Las malezas deben estar en activo crecimiento, sin estrés. Debe evitarse el contacto de SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM y Glifosato con ramas, hojas y frutos del árbol frutal. Es aconsejable el uso de protectores y/o picos anti-deriva.
LIMONERO MANDARINO NARANJO MANZANO PERAL	35 g/ha + Glifosato 1080 g i.a. como eq.ac./ha (*),(**)		Se recomienda que las malezas no excedan los 10cm de altura o 5cm de diámetro de roseta (2 - 4 hojas) En caso de malezas presentes que superen el tamaño óptimo recomendado para la aplicación de SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM , se recomienda el agregado de Auxinas sintéticas en mezcla de tanque. En esta situación los niveles de fitotoxicidad foliar podrían incrementarse. Se recomienda la aplicación de SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM 25g producto formulado / ha en el estado fenológico de macollaje para el control de nuevos nacimientos de malezas de hoja ancha, luego de un tratamiento con herbicidas residuales durante el barbecho corto del cultivo de trigo.
	70 g/ha + Glifosato 1080 g i.a. como eq.ac./ha (*),(**)		No se recomienda el agregado de ningún tipo de adyuvante. En esta situación los niveles de fitotoxicidad foliar podrían incrementarse. Se recomienda el agregado de Auxinas sintéticas en mezcla de tanque de SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM con Flurocloridona, Bromoxnil y graminicidas como Pyroxulam, Pinoxaden; Iodosulfuron + Mesosulfuron. Evitar la aplicación de Iodosulfuron + Mesosulfuron. Evitar la aplicación de SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM + Glifosato sobre el rebrote (aproximadamente 20 días después de la primera aplicación) a igual dosificación que la primera aplicación, teniendo como objetivo disminuir la probabilidad de supervivencia de las mismas. Esta segunda aplicación debe realizarse dentro del período de barbecho previo a la siembra del cultivo.
ALGODÓN	35 g/ha + Ésteres metílicos de aceite vegetal 1 % v/v	Pre-cosecha de Algodón	Aplicar cuando se tenga entre 65 a 70 % de capsulas abiertas
GARBANZO	70 g/ha+ 250 ml/ha Ésteres metílicos en mezcla con siliconados	Pre-cosecha de Garbanzo	Aplicar cuando se tenga al menos 80% de vainas de color amarillo/marrón y se visualice senescencia natural con no más del 40% de las hojas aún verdes.

Malezas que controla **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** a la dosis de 25 g/ha en aplicación post emergente de Trigo

Nombre común	Nombre científico	Tamaño
Flor de Santa Lucía (****)	<i>Commelina erecta</i> (****)	10 cm de diámetro
Malva	<i>Malva parviflora</i>	Hasta 20 cm de altura
Malva cimarrona	<i>Anoda cristata</i>	Hasta 20 cm de altura
Quinoa blanca	<i>Chenopodium album</i>	Hasta 20 cm de altura
Rama negra	<i>Conyza bonariensis</i>	Roseta de 10 cm
Saetilla	<i>Bidens pilosa</i>	Hasta 20 cm de altura
Senecio amarillo	<i>Senecio madagascariensis</i>	Hasta 20 cm de altura
Sunchillo	<i>Wedelia glauca</i>	Hasta 20 cm de altura
Trébol de olor blanco	<i>Melilotus albus</i>	Hasta 20 cm de altura
Tutía	<i>Solanum sisymbirifolium</i>	Hasta 20 cm de altura
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	Roseta de 10 cm
Viola silvestre	<i>Viola arvensis</i>	Roseta de 10 cm
Yaguá pety hú / Assa peixe roxo	<i>Vernonia westringiana</i>	Hasta 20 cm de altura
Yerba del sapo	<i>Ricardia brasiliensis</i>	10 cm de diámetro
Yuyo colorado (*****)	<i>Amaranthus hybridus</i>	Hasta 20 cm de altura

(*) Es equivalente en producto formulado a: Glifosato 48 % p/v: 3 L/ha Glifosato 66,2 % p/v: 2 L/ha Glifosato 74,7 % p/v: 1,5 kg/ha

(**) Dosis recomendada para la mezcla de tanque con **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** en el control de las malezas de hoja ancha indicadas. La dosis de Glifosato podrá incrementarse, si así se requiere para control de otras malezas no contempladas en este barbecho, de acuerdo a lo especificado en las respectivas recomendaciones de uso del producto a base de Glifosato utilizado.

(***) En caso de contar con malezas que se encuentren en el extremo superior de tamaño se sugiere adicionar a la mezcla una auxina sintética (HRAC-O) (WSSA-4).

Los mejores resultados se obtienen al utilizar **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** + formulaciones Premium de Glifosato. En todas las situaciones **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** debe ser aplicado con el agregado de Glifosato. En caso de utilizar **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** + Glifosato (48 % p/v) la adición de éster metílico de aceite vegetal muestra un incremento en la contundencia del tratamiento y velocidad de quemado. En aplicaciones de **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** + Glifosato en barbecho otoño/invernales se recomienda agregar Metsulfuron siendo ésta una excelente combinación de herbicidas de distinto modo de acción para el control post-emergente y pre-emergente de las malezas en períodos prolongados.

Malezas de hoja ancha (Dicotiledóneas) que controla SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM + Glifosato: (barbecho químico, montes frutales, forestales)

Nombre común	Nombre científico	Tamaño
Afata	<i>Sida rhombifolia</i> L.	Hasta 20 cm de altura
Altamisa	<i>Ambrosia tenuifolia</i>	Hasta 20 cm de altura
Campanilla	<i>Ipomoea purpurea</i>	10 cm de diámetro
Cardo ruso	<i>Salsola kali</i>	Hasta 20 cm de altura
Cardo torito	<i>Acirocarpa tribuloides</i>	Roseta de 10 cm
Cerraja	<i>Conyza oleracea</i>	Roseta de 10 cm
Corregüela	<i>convulvulus arvensis</i>	10 cm de diámetro

Glifosato disponibles en el mercado tanto líquidas como sólidas. En aplicaciones como desecante, **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** puede ser usado en mezclas de tanque con Tiazuron + Diuron, Ciclanilida + Etefon, Etefon, Tiazuron y Glifosato.

FITOTOXICIDAD: En caso de producirse lluvias fuertes posteriores a la aplicación de **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** o un intervalo muy corto entre aplicación y la siembra, se puede observar fitotoxicidad. Dichos síntomas desaparecen con el desarrollo del cultivo y no afectan el rendimiento del mismo. Se pueden observar daños en el cultivo en situaciones de estrés (ej.: suelos de baja fertilidad, semilla enferma o dañada, altas/bajas temperaturas, humedad excesiva, suelos con elevado pH, alta concentración de sales o sequía).

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Girasol: Para el caso del cultivo de Girasol los mejores resultados se obtienen cuando la humedad del grano es inferior al 30 %. Esta condición se correlaciona en muchos casos, con un color amarillento del envés del capítulo y las brácteas se tornan amarionadas.

Garbanzo: Se recomienda aplicar cuando el 80 % de las vainas hayan virado del color verde al amarillo/marrón y no quede más de un 30-40 % de hojas verdes.

Poroto y arveja: Los mejores resultados se obtienen cuando la aplicación se realiza teniendo la mayoría de las vainas maduras (> 75 % de color marrón, ubicando el bajo de vainas inmaduras, de color verde, en el estrato superior del canopy.

Soja: Aplicar cuando el 90 % de las vainas estén de color marrón. Pudiéndose encontrar en el estrato superior algunas de color amarillento o grisáceo. El 70-80 % de las hojas deberían haberse perdido y las restantes tener un color amarillento.

Periodo de carencia: En aplicaciones de barbecho químico, montes frutales (Limonero, Mandarino, Naranjo, Manzano, Peral), montes de Eucaliptus: No requiere fijación de una tolerancia debido a su uso en aplicaciones como desecante, entre aplicación y cosecha deberán transcurrir para el cultivo de Girasol: 14 días, Algodón: 30 días, Soja: 7 días, Poroto: 7 días, Arveja: 7 días, Garbanzo: 15 días. Maíz: Uso posicionado.

RESTRICCIONES DE USO:
En suelos alcalinos (pH>7) o arenosos (>70 % de arena) y menos de 2 % de materia orgánica es recomendable un intervalo de al menos 15 días entre la aplicación de **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** y la siembra del cultivo (Soja, Maíz).

Hasta no contar con mayor información, no se recomienda el uso de **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** en árboles frutales en vivo; ni en primer y segundo año, desde la plantación comercial. **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** no debe aplicarse en el cultivo de la Vid o presiemra de Girasol y Poroto.

Aplicación como desecante en los cultivos de Algodón, Girasol, Garbanzo, Poroto y Soja:
En caso de utilizar Metsulfuron + Dicamba en aplicaciones de postemergencia del cultivo de trigo, se recomienda el agregado en mezcla de tanque de **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** como complemento en el control de malezas.

Algodón: En el caso de utilizarlo como acondicionador de cosecha/deseccante de Algodón, se recomienda aplicar cuando las plantas alcancen un 65 a 70 % de capsulas abiertas y las hojas estén maduras cambiando de color verde intenso a colores rojizos. Luego de la aplicación las hojas comienzan a secarse y a caer desde los 3 días posteriores a la aplicación llegando a su máximo a los 10 días post aplicación. Evitar aplicaciones con temperaturas muy altas, mayores a 27 °C, en horas de intensa insolación que puedan ocasionar un

Algodón: No aplicar **SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM** en lotes de Algodón que va a ser usados para semilla.

COMPATIBILIDAD: SAFLUFENACIL 70 WG AGROTERRUM es compatible con las formulaciones de



CUIDADO

